240 65



ILLUSTRISSIMO, CLARISSIMO,

D. D. JOANNI-BAPTISTÆ-ELIÆ,


CAMUS DE PONTCARRÉ,

DE VIARME,

REGI A SANCTIORIBUS, CONSILIIS,

NEC NON URBIS PRÆFECTO,

Vovet, offert & consecrat obsequentissimus, J. F. LATASTE, *Chirurg. Studios.*



THESES
ANATOMICÆ ET CHIRURGICÆ.

EX
ANATOMIA.



NNUMEROS inter, quibus obruitur corpus humanum, Morbos. Periculosum sanè, & pertimescendum. Hydropem censemus, sed cùm plerumque, ab organorum secretoriorum ingurgitatione, producatur, & de ascite, id est de aquæ in abdominis cavitate, stagnatione, tantùm simus dicturi, Anatomiæ facem præmittemus.

Abdominis partes in continentes, & contentas dividi solent, continentes in communes, & proprias, communes sunt tegumenta communia; propriæ autem tùm musculares, tùm osseæ, tùm membranaceæ habentur. Contentæ verò sunt omnia viscera in abdomine contenta, quorum usus diversus, alia enim digestioni, chilificationi, generationi, &c. inserviunt.

Ventriculus est pars organica, in infimo ventre, sub diaphragmate sita. Præcipuum digestionis organum. Pars istius visceris sinistra, quæ Major est, in sinistro latere deprehenditur, dextra verò ad Jecur. Duo observantur orificia, substantia quadruplex, figuram tibiæ utricularis, referens. Diversa visceris istius amplitudo, Vasa à Liene brevia dicta. Cœliaca totam permeant substantiam. Nervi ab octavo pari plexum Coronarium efformantes.

OMENTUM seu Epiploon est Membrana duplex ; adiposa, ad hepar, Lienem, & Ventriculi fundum, sita, intestinorum anfractûs, quasi involvens, in non nullis usque ad Umbilicum protensus. Marsupii figuram referens, à peritonæo oritur, & ut duplicatum peritonæum, fundo ventriculi inhærens, dorso, & intestino Colon. Omenti substantia Multa intersecatur pinguedine, Vasa à Cœliacâ, & Mezenterico Ramo, altera etiam dicuntur adiposa, intestinorum faciliorem, reddit motum

INTESTINA sunt Corpora, oblonga, concava, rotunda, à piloro usque ad anum protensa. Quæ in tenuiora, & crassiora, & in abdomine Mezenterii ope connexa, quorum Vasa diversi mode nominantur, Lactea alia, aliasanguifera, à Mezenterica superiori, & inferiori orta. Nervi verò à vaguo pari.

MEZENTERIUM est Membrana duplex, adiposa, innumeris dissеminata glandulis à primâ, & tertiâ lumborum vertebrâ orta, *intestina connectens*, vario *dicitur nomine*, Mezereon *scilicet*, & *Mezocolon*, arteriæ Mezeraicæ, ab aorta inferiori, totam permeant substantiam. Nervi ab octavo pari, glandularum usus, est liquorem quemdam album, vulgo chilum dictum, secernere, & perficere.

PANCREAS, est glandula conglomerata, sub posteriori ventriculi parte, hujusque fundo, sita duodeno, venæ portæ, usque ad Regiones Epatis & Lienis, cui per Membranas alligatur. Ab arteriis Rami *sinistri* Cœliaco & Ramo *splenico* irroratur. Nervi ab octavo pari *in isto viscere*. Liquor albus secernitur, succus panereaticus dictus.

HEPAR ost pars organica, in infimo ventre, sub diaphragmate, hippocondrio dextro est plurimum sita, bilis secretioni dicata. A parte anteriori convexa, & gibbosa, à parte verò posteriori, concava, in duos dividitur Lobos, additur etiam Lobulus, ab authore spigellii dictus. Ligamentis plurimis in situ firmatur. Reperitur etiam capsula glissonii dicta, Vasa à cœliacâ venâ portâ, venâ cavâ, &c.

VESICULA fellis, ceu cistis fellea, est vesicula in parte anteriori hepatis concavâ sita, ad figuram piri inversi, quodam modo accedens. Duplici donatur Membranâ, quarum prior, eadem est & communis hepati. Secunda verò, propria, den-

fæ, & craffa; omni fibrarum genere conflata, ex inferiori, & anguſtiori parte, oritur canalis cyſticus. Dictus. Vaſa, à dextro cœliacæ ramo, nec non à venâ portâ, recipit, & continet bilem, in hepate ſecretam.

Lien, ſivè ſplen, eſt Viſcus Atro-Rubens, in ſiniſtro ventriculi latere, ſub diaphragmate, ad coſtas ſitum, haud raro linguæ formam æmulatur, concavum verſus ventriculum, convexum verò verſus diaphragma, & coſtas; ſubſtantia, vaſculoſa & fibroſa. Connectitur cùm Ventriculo, vaſorum brevium ope, Membranæ Lienem cùm diaphragmate, omento, & Rene ſiniſtro alligant arteriæ, à cœliacâ ſplenicæ dictæ, Vena ſplenica dicta, variis diſtinctis Ramis, ſuperficiem irrorant. Nervi à plexu ſplenico, quidam contendunt Lienem bilis ſecretioni inſervire.

EX CHIRURGIA.

QUO plura, Morborum cohortem, concomitantur accidentia, eo citius, & tutius auxilia, & operationes, ſubminiſtrat Chirurgia. *Quot cives etenim, abſque excellentiſſimæ iſtius Artis, & ſcientiæ præſidio, ſupremum obiiſſent* diem: quot hydropici V. G. à periculoſiſſimo iſto morbo fuerunt ſublevati.

Hydrops, à duobus verbis Græcis, derivatur Υδωρ, ſcilicet, & Πιειν quæ ſignificant aquam bibere. Sub duplici conſideratur reſpectu, vel totam corporis peripheriam, adimplens; tunc anazarca, ceu leucophegmatia: quæ duo verba, à Græco, Ανα, Σαρχος, ſupercutem & Λευκος & Θλεγμα, pituita alba. Si verò in capacitate abdominis aſcites dicitur.

Ascites de qua ſumus tantùm, dicturi, eſt abdominis tumor, maxima aquarum collectione, in ipſa met cavitate, productus. Derivatur à verbo Græco Ασχως, quòd hirci cutem ſignificat.

Hydrops in generalem, & specialem, dividi solet. Diverso gaudens nomine, juxtà partes affectas, in capite V. G. hidrocephalos, in pectore plevrocele, in abdomine ascites, in scroto hidrocele, &c. Hidropisis causæ primariæ, & *secundariæ*, *primariæ*, *vel à solidis*; *vel à fluidis*, ex parte solidorum si nimium laxata, vel nimium tensa, à fluidis, vel nimium spissa, *vel dissoluta.* Secundariæ, à plurimis causis externis, vel ab aere nimium denso, ab alimentis oleaginosis immoderatâ vini potatione, quæ omnibus accidentibus ansam præbent, indè tardior sanguinis motus, arteriarum lentior pulsus, relaxantur Musculorum actiones, & totus corporis habitus in maciem decidit.

Ascitis Signa diagnostica, plurima habentur, urinarum fluxus minuitur, abdominis gradata intumescentia, lentior pulsus, totius corporis gravitas, respiratio difficilis, immoderata sitis, febris lenta, aquarum præsentiæ in abdominis cavitate notitia, &c.

Prognostica verò à causis, ab ægroti viribus, ætate, temperamento, à majori vel minori aquarum stagnantium copiâ, &c. sunt desumenda, imò periculosissima.

Duplici modo, hujusce morbi curatio, *vel ab arte*, vel à remediis, tùm interne, tùm externe adhibitis; remedia interna, sunt ea quæ salibus acribus, urinarum *promovent fluxum, quibus* frustrà adhibitis, Chirurgia promptiora suppeditat auxilia.

Diversæ, juxtà operationes, ad aquarum effluxûs necessarias, sententiæ. Alii enim scalpellum, alii acum triquætram proposuerunt. Ex duabus istis methodis, posterior nobis anteponenda videtur. Quæ ut rite celebretur, ægrotus in lecti margine collocandus, ita ut in latere, in quo instituenda operatio, incumbat. Tunc Chirurgus in medio, intra ombilicum & anteriorem, & superiorem ossis ilei spinam, acûs triquætræ ope, operationem instituet.

Quandoque tamen, aquarum effluxus sistitur, vel à nimiâ ipsarum spissitudine, vel ex partibus, omento scilicet, & intestino, quòd facillime spicili ope terminatur.

EFFLUXIS aquis, in lecto collocetur, æger, & fasciis vino calido imbutis, instituenda deligatio, & remedia tum aperitiva, diuretica, purgativa & diluentia designanda.

Has Theses, DEO JUVANTE, & Præside M. NICOLAO-RENATO JALLET, *Artium Liberalium & Chirurgiæ Magistro, nec-non Regiæ Academiæ Chirurgiæ socio, tueri conabitur*, JOANNES-FRANCISCUS LA TASTE, Parisinus, *Artium Liberalium, in almâ Universitate Parisiensi, Magister.*

PARISIIS,

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

Die Lunæ 27ª *Novembris, anno salutis* 1758, *à sesqui secundâ ad septimam.*

PRO ACTU PUBLICO.

ET MAGISTERII LAUREA.

Typis Viduæ DELAGUETTE, Collegii & Academiæ Regiæ Chirurg. Typographi, viâ San-Jacobeâ, sub signo Olivæ.